

Procedura ręcznego odciągania siary u pacjentki w szpitalu (opr. A. Muszyńska)

Przygotowanie do odciągania:
Uzyskaj zgodę od pacjentki na pobranie pokarmu kobiecego Przygotuj zestaw (strzykawka, koreczek, pojemnik, rękawiczki jałowe) Umyj i zdezynfekuj ręce Założ jałowe rękawiczki
RĘCZNE ODCIĄGANIE SIARY
Ułóż palce na otoczce, zbliżaj kciuk i palec wskazujący do siebie, lekko obracając i przemieszczając palce do przodu tak, by uzyskać krople siary lub regularny wypływ Uzyskany pokarm nabieraj do strzykawki (krople) lub zbieraj do pojemnika na siarę (wypływ) Zwolnij ucisk, powtarzaj rytmicznie ruchy, uciskając otoczkę ruchem wygarniającym, nie przesuważąc palców po skórze
Zabezpieczenie materiału i transport do dziecka
Zabezpiecz strzykawki z pokarmem kobiecym igłą lub koreczkiem / dokładnie zamknij pojemnik Podpisz strzykawki/pojemnik z pokarmem kobiecym plastrem lub nalepką z nazwiskiem i imieniem pacjentki oraz datą i godziną odciągnięcia siary Sprzątnij zestaw Zdejmij rękawiczki Umyj ręce Zanieś strzykawki/pojemniki z siarą na oddział, gdzie znajduje się dziecko pacjentki i przekaz dyżurnej położnej lub pielęgniarce, która umieści w lodówce, jeśli pokarm nie będzie od razu podawany dziecku Dokonaj zapisu w dokumentacji medycznej pacjentki
Wdrożenie procedury na oddziale:
Decyzja ordynatora/oddziałowej/dyrektora szpitala Szkolenie teoretyczne (wszystkich) i praktyczne (personelu wykonującego procedurę) Monitorowanie efektów (liczba noworodków oddzielonych od matek otrzymujących mleko kobiece)